

15. 欧鸽 *Columba oenas* Linnaeus

英文名 Stork Pigeon, Stock Dove.

地理分布 见于新疆西部喀什和天山。在国外，遍布于欧洲，北抵芬兰及斯堪的纳维亚半岛南部；非洲北部；东抵小亚细亚，伊朗等。

鉴别特征 体羽大都暗灰；上背，后颈下部及颈侧闪耀着绿的真珠色，上胸呈带紫的粉红色；尾具黑色末端。

形态(依阿尔巴尼亚地拉那地区的指名亚种)

雄性成鸟 头部纯蓝灰色；后颈下部、颈侧及上背等，均闪耀着绿的真珠色；下背及两翅的内侧覆羽和飞羽等均为沾褐的暗灰色；翅上覆羽灰色，横贯以两道不完整的黑斑，飞羽以及初级覆羽与小翼羽均淡褐色；腰及尾上覆羽淡灰，尾羽灰色稍暗，而具宽阔的黑端；下体从胸以下悉灰色，尾下覆羽稍深些。

雌性成鸟 与雄鸟相似，但羽色稍暗淡些。

虹膜红褐；嘴的基部亦红，嘴端渐变黄色；脚粉红色。雌鸟的嘴和脚均带暗色。

量衡度：

性别	体重	全长	翅	
♂(1)	300	326	215	} 据阿尔巴尼亚标本 的标笺
♀(1)	300	325	215	

亚种分化 本种有 2 个亚种的分化。我国只产 1 个亚种，即新疆亚种 *Columba oenas yorkandensis*。

据 Vaurie (1965)，*C. o. yorkandensis* 比指名亚种体色较淡，下体更灰、更少灰蓝，翕部更少褐色；体形略大，翅长 $6\sigma \sigma 206-230(219)$ ，而从瑞典所采的指名亚种，翅长 $6\sigma \sigma 204-221(213)$ 毫米。

Columba oenas yorkandensis Бутурлин, 1908 Ежег. Зоол. Муз. Акад. Наук, 13: 325(模式产地：新疆喀什)。

Columba oenas tianshanicus Бутурлин, 1916. Наша Охота, 9 (模式产地：苏联纳伦)。

生态 据 Goodwin (1970)，此鸟几乎全在地面上找食杂草种子、谷物及小型的无脊椎动物，如小螺等，有时还兼食幼芽、嫩枝和树叶等。巢常营于树洞、岩棚的隐蔽处、老旧的房屋或石坑中，以枯叶、细枝、嫩枝等作为巢料，量并不多，常是很少，甚或全无，求偶时，常频频发出“coo-coo”声，叫时还鞠躬点头，与其他鸽类相同。卵每窝 2 枚，孵卵期 16 天。

Columba oenas Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 162 (模式产地：瑞典)；Salvadori, 1893, 261—264; Peters, 1961, 60—61; Vaurie, 1965, 540—542; Goodwin, 1970, 66—68; 郑作新, 1976, 266; de Schauensee, 1984, 249.