

19. 灰林鸽 *Columba pulchricollis* Blyth

英文名 Ashy Wood Pigeon.

地理分布 见于西藏、云南及台湾。在国外，分布于印度、尼泊尔、缅甸和泰国的北部。

鉴别特征 额至枕深灰；颈环黄色，各羽基部均点黑，上背紫色沾绿闪艳。

形态(依据 Baker, 1928) 头顶至枕鸽灰，头侧稍淡，颈和喉白；后颈下部具一个明显皮黄色半领圈，各羽基部均点黑。颈圈向下与近白色下喉相连；上背黑褐，闪着绿色沾紫光辉；下背和腰均石板黑，向后至较短的尾上覆羽转石板灰；较长的尾上覆羽以及尾羽等均黑褐色；翅上覆羽铅灰褐色，在内侧者较暗；初级和次级飞羽均暗褐，第二至第五枚初级飞羽具浅棕色狭缘；胸灰褐，至腹转为暗黄，尾下覆羽皮黄，两胁略带紫灰；腋羽黑褐。

雌雄同色。

虹膜淡黄；嘴黄，基部沾绿；脚和趾深红或紫红色，爪角黄色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	310	350	18	197	128	21(据昆明所)
♂♀	—	约 375—400	16—17	194—216	120—130	约22—25 (Baker)

生态 性怯而沉默，难得获见。平时树栖，单独、成对或 10—30 只结集成小群活动于以栎类为主的常绿阔叶林中。食物为各种核果、橡实浆果、谷物、种子等。

在台湾阿里山，营巢从 5 月底开始。巢营于栎树丛 (*Quercus*, *Machilus*) 间，以粗枝筑成平台状，犹如其他林鸽一样。卵稍呈椭圆状，呈白色而无光亮。3 个卵量度：38.0 × 28.5；38.0 × 27.0；38.2 × 28.1 毫米(据 Hachisuka and Udagawa)。

Columba pulchricollis "Hodgson" Blyth, 1845, Journ. As. Soc. Bengal, 14: 866 (模式产地：尼泊尔)；Salvadori, 1893, 305—306；Hachisuka and Udagawa, 1951, 130；Baker, 1928, 230—231；Smythies, 1953, 426；Peters, 1961, 68—69；Vaurie, 1965, 548；Ali and Ripley, 1969, 134—135；Goodwin, 1973, 83—84；郑作新, 1976, 267—268；中国科学院昆明动物研究所鸟类组, 1980, 1；de Schauensee, 1984, 250。