

20. 紫林鸽 *Columba punicea* Blyth

英文名 Purple Wood Pigeon.

地理分布 国内仅见于西藏南部亚东及海南。在国外零星分布于巴基斯坦、印度北部和阿萨姆、孟加拉国、缅甸、老挝、泰国、越南中部和南部，南抵马来半岛的北部。

鉴别特征 头灰；上体栗褐，尾黑褐；下体铜栗色。

形态 (依据从海南五指山于4月19日采得的标本)

雌雄同色。头顶和后颈均鸽灰；背及两翅表面深栗褐，而有紫色金属光泽，有些背羽微具宽阔的青铜绿色端缘；腰及尾上覆羽浅葡萄褐色而具黑缘；两翅除内侧部分与背同色以外，大都黑褐；尾羽亦然，但更黑些；下体大都葡萄栗，而渲染黄铜色，向后至尾下覆羽渐转为带黑的浅葡萄栗色。

雄鸟背羽较多绿色光亮。

虹膜乳黄；嘴呈深角色；脚和趾均洋红，爪浅角色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	535	354	18	209	147	75
♂(1)	—	—	17.2	221	156	26
♀♀(2)	—	—	16.3	206、211	149、151	25.3、26.4

据《海南岛的鸟兽》，1983。

生态 一般单独活动。据 Goodwin (1970)，嗜食果实，包括浆果、无花果等，兼食种子及农作物等。平时出没次生林区边缘，或隐匿树叶稠密处。

Columba (Alsocomus) puniceus "Tickell" Blyth, 1842, Journ. As. Soc. Bengal, 11:461 (模式产地：缅甸)。

Columba punicea, Salvadori, 1893, 306—308; Peters, 1961, 69; Ali and Ripley, 1969, 135—136; Goodwin, 1973, 86; 郑作新, 1976, 268; 郑作新等, 1983, 119; Smythies, 1983, 426; 广东省昆虫研究所动物室等, 1983, 117—118; de Schauensee, 1984, 250.

Alsocomus puniceus, Baker, 1928, 232—233.