

31. 绿背金鸠 *Chalcoptaphs indica* (Linnaeus)

英文名 Emerald Dove, Bronzed-winged Dove.

地理分布 与本属的分布同, 详见前文。

鉴别特征 头顶蓝灰; 上背及两翅的覆羽和内侧次级飞羽均翠绿闪耀; 胸紫褐, 向后渐淡。

形态(依据采自海南的标本)

雄性成鸟 前额和眉纹白色; 头顶和后颈均蓝灰; 上背及两翅的覆羽和内侧次级飞羽均翠绿, 而具金属青铜色反光; 下背和腰均黑(腰或微缀以棕点), 二者后缘均各具一道淡银灰色横带斑; 尾上覆羽暗蓝灰色, 羽端变黑; 翅上飞羽和初级覆羽暗褐; 中央尾羽黑褐; 外侧尾羽蓝灰, 而具宽阔的黑褐色次端斑。头侧、颈侧以及喉、胸等均紫褐色(此色有时延伸至后颈基处), 向后渐淡, 下腹微带灰色; 尾下覆羽灰蓝。

雌性成鸟: 前额蓝白; 无白色眉纹; 头顶和后颈褐色缀黑; 雄鸟的紫褐色转为暗褐色; 尾羽亦均暗褐, 外侧尾羽具棕栗色次端斑。

虹膜暗褐; 眼脸铅灰; 嘴珊瑚红, 基部较暗; 跗蹠和趾均紫红, 爪角褐色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(5)	112—130	225—240	16—19	135—143	79—99	22—26
♀♀(2)	95—114	232—240	15—17	128—133	84—92	23—24

生态 常见于海南岛的山地及山沟等处单独或成对活动。受惊时, 立即起飞, 但离地面不远, 而又下降。在树林中, 能作曲线状飞行。于地面则行走轻快, 并不时发出柔和而低沉的“ge--ge--”声。食物主要为野果, 但也兼吃一些谷物、草子及白蚁等。

繁殖在3—5月间。巢用细枝、小藤等筑成, 多置于高灌木丛间或竹丛顶端, 离地面约2—4米高。卵每产2枚。

Columba indica Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1:164 (模式产地: 印度尼西亚安波那).

Chalcoptaphs indica, 1893, 514—520; Baker, 1928, 215—217; Deignan, 1945, 156—157; Hachisuka and Udagawa, 1951, 132—133; Smythies, 1953, 424—425; Peters, 1961, 114—116; Ali and Ripley, 1969, 157—159; Goodwin, 1973, 176—177; 郑作新, 1976, 276; 中国科学院昆明动物研究所鸟类组, 1980, 54; 广东省昆虫研究所动物室等, 1983, 122—123; de Schauensee, 1984, 253.