

24. 褐鹃鸠 *Macropygia phasianella* (Temminck)

英文名 Dark Cuckoo Dove, Brown Cuckoo Dove.

地理分布 仅见于台湾。国外分布于菲律宾、印度尼西亚以至澳大利亚的东北隅。

鉴别特征 体形大小与斑尾鹃鸠相似。上体大都暗肝褐色，上背闪着金属绿紫光辉；下体金棕褐色。

形态(据 Hachisuka and Udagwa 1951) 头和后颈栗褐，杂以黑色细纹，头顶和枕近黑，而有紫红色反光；上体余部黑褐，微有金属光彩，上背闪绿；两翅与背同，翅上小部分覆羽锈褐；尾羽亦与背同色，外侧两对的基部锈褐，并有不明显的黑色横斑；下体锈褐，而具黑褐色细斑，颏和喉较淡无斑，两肋及腹较暗。雌雄同色；但 Goodwin (1973) 和 de Schauensee (1984) 却以雌鸟与雄鸟有别。据 Goodwin，雌鸟的头顶棕褐，颈和胸均无粉红色光泽，颈与下体的灰色点斑较一般雄鸟更加显著。de Schauensee 则以雌鸟的上翕部为棕黄色，各羽杂以黑色斑点，并无金属紫色闪光，胸羽均具黑缘，显得为斑杂状。

虹膜蓝色 (Salvadori, 1893)；嘴褐色，基部沾红，脚和趾暗红褐色。

量度(据 Hachisuka 等, 1951):

	翅	尾
♂ ♀	191—205	160—199

亚种分化 本种计有 12 个亚种，其中仅有 1 个见于我国台湾省的兰屿，即：鸟鹃鸠台湾亚种 *Macropygia phasianella phaea* McGregor. 其形态和量度均见于前文。

Macropygia phaea McGregor, 1904, Bull. phil. Mus., 4:9 (Calayan Is.).

Macropygia tenuirostris septentrionalis Hachisuka, 1930, Orn. Soc. Japan Suppl. Publ., 14:151(台湾兰屿)。

生态 栖于稠密树林中。性怯，难于接近。常 2—3 只结集飞行，绝不集成大群。飞时两翅拍动很响；叫声近似此鸟在兰屿的俗名“ivoao”。食物为果实和浆果等。繁殖开始于 5 月间。Kano (1934) 在 7 月 23 日曾找到一只刚孵出的雏鸟及一个快要孵化的卵 (据 Hachisuka 等, 1951)。

Columba phasianella Temminck, 1821, Trans. Linn., Soc. London 13: 129 (模式产地：澳大利亚新南威尔士)。

Macropygia phasianella, 1893, 349—351; Hachisuka and Udagwa, 1951, 132; Peters, 1961, 79—80; Goodwin, 1973, 132—133; 郑作新, 1976, 269; de Schauensee, 1984, 252—253.