

1. 红翅凤头鸲 *Clamator coromandus* (Linnaeus) (图版III:图 1)

别名 红翅凤头郭公、冠郭公。

英文名 Red-winged Crested Cuckoo.

地理分布 东南沿海各省,自江苏徐州西至甘肃武山,四川新都、屏山及云南南部(夏候鸟,在台湾为罕见旅鸟)。另外,自喜马拉雅山脉南抵印度、斯里兰卡,东至菲律宾及印度尼西亚。

鉴别特征 头具长羽冠;上体黑色而有一白领环;翅栗色。长尾的体型以及羽色等很像褐翅鸲,只体显得较小。

形态(依据广西瑶山标本)

成鸟 头顶包括羽冠、枕部及头侧黑色而具蓝辉;后颈白色,形成一个半领环;背、肩及翼上覆羽、最内侧次级飞羽黑色而具金属绿色亮辉;自腰至近尾端黑色,具深蓝色亮辉;尾羽均具狭形白端;两翅栗色,飞羽端苍绿;颈至上胸淡红褐色,但深、浅度有变异;上胸以下至腹部白色;两胁及肛部苍褐色;尾下覆羽黑色,翼下覆羽淡红褐色;腋羽淡棕色。




图 28 红翅凤头鸲 *Clamator coromandus* 的分布

幼鸟(7月,瑶山) 上体褐色,各羽与翼上覆羽、飞羽端等均缘以棕色;下体一般白色。

虹膜淡红褐色;嘴黑色,下嘴基部近淡土黄色,嘴角略呈肉红色;脚铅褐色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(16)	88.4	380.1	26	157.7	232.3	26.7
	(76—114)	(355—415)	(25—27)	(154—161)	(220—240)	(26—27)
♀♀(10)	87.3	387.0	24.2	154.6	203.8	26.2
	(67—110)	(352—418)	(23.2—25)	(148—156)	(164—222)	(25—27)

生态 夏天常见于我国南部,一般在林木较多但较开阔的山坡、山脚或平原活动,在较广阔的园林中也易见到,偶然见于住宅旁的孤立树上。多单独或成对活动,常活跃于较暴露的树枝间,不似一般杜鹃那样爱隐蔽于叶簇中。飞行力不强,快速而不持久。鸣声尖锐清晰,有点像“ku-kuk-ku”之声,或三声、或二声之反复。广东省昆虫研究所等(1983)记录此鸟以毛虫、白蚁等昆虫为食,笔者还见其在小乔木上啄食野果。

红翅凤头鸲4月始见于广东沿海,开始成对活动,求偶时雄鸟尾羽略张开,两翅亦稍向两侧耸起,绕着雌鸟作碎步追逐姿态。据 La Touche (1931—34),红翅凤头鸲在长江流域产卵于画眉 (*Garrulax canorus*), 黑脸噪鹛 (*Garrulax perspicillatus*) 的巢中,卵蓝色,近圆形,故比寄主的形短。

经济意义 嗜吃松毛虫和白蚁,为森林益鸟。此外,它又是较美观的鸟,可供饲养。

Cuculus coromandus Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1: 171 (模式产地: 印度科罗曼德尔)。

Clamator coromandus, Baker, 1927, 4: 170—171; La Touche, 1941—34, 2: 53—54; Peters, 1940, 4: 12; Ali et Ripley, 1969, 3: 12—14; 郑作新等, 1973, 84; 郑作新, 1976, 281—282; 张万福, 1980, 163, 广东省昆虫研究所等, 1983, 125; de Schauensee, 1984, 262.