

别名：白尾鹲，长尾热带鸟。

英文名：White-tailed Tropic-bird.

地理分布 遍布于印度洋、太平洋及大西洋的热带和亚热带地区。国内分布详见亚种记述。

形态 成鸟：全身大都白色，翅上有黑色斑，初级飞羽的外侧亦黑；中央一对细长尾羽全为白色，与红尾热带鸟显然有别。

嘴黄或橙黄；脚及趾的基部亦黄。

量度 (据张万福, 1985)：

性别	嘴峰	翅	中央尾羽	外侧尾羽
♂ ♀	43—50	239—272	297—485	100—111

亚种分化 据 Peters 等 (1979, vol. 1 (2nd ed.)), 此种热带鸟计有5个亚种，其中获见于我国台湾省，仅1个亚种：*Phaethon lepturus dorotheae* Mathews。

Phaethon lepturus dorotheae Mathews, 1913, Austral Avian Rec. 2: 7 (模式产地: Queensland).

据王嘉雄等 (1991)，此鸟于1912年曾在山区捕获1只；澎湖、屏东龙銮潭等处均曾发现，当系迷鸟。

生态 与上文所述关于此科的特征同。

Phaethon lepturus Daudin, 1802, in Buffon, Hist. Nat. (ed. Didot) Quadr. 14: 319 (模式产地: Mauritius).