

## 1. 红嘴热带鸟 *Phaethon aethereus* Linnaeus

别名：红嘴鹎，短尾热带鸟。

英文名：Red-billed Tropic-bird; Short-tailed Tropic-bird.

**地理分布** 印度洋、太平洋、大西洋等的热带和亚热带部分。在我国曾获见于西沙群岛（详见后）。

### 形态

成鸟：体羽白。眼的前缘黑；枕部、后颈、背部以至尾上覆羽，均具黑色的细狭横斑；翅上有黑色斑纹，但有时不很明显；尾较其他热带鸟为短，故又被称为短尾热带鸟。

虹膜暗褐；嘴辉红，有时呈橙黄色（Ben *et al.*，1978）；跗蹠黄色；趾及蹼均黑。

**量度**（据张万福，1985）：

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♀	55—60	261—301	215—301	25—28

幼鸟：体色与成鸟相似，但嘴呈黄色，头顶近黑，背部黑斑较阔；尾缺特长的中央尾羽。

**亚种分化** 据 Peters 等（1979，vol. 1（2nd ed.）），此种热带鸟计有3个亚种，分布于热带和亚热带的海洋岛屿上。在我国境内，仅有1个亚种：

### （1）海南亚种 *Phaethon aethereus indicus* Hume

*Phaeton indicus* Hume, 1876, Str. Feath. 4: 481（印度：Mektan Coast）。

分布在海南西沙群岛（据 Delacour *et* Jabouille, 1991, p. 30—31）。

**生态** 习性见本科的论述。非常罕见。善于长期飞行，亦擅在海面上游泳，但不潜入海水中，在登陆时，拙于走动。它曾被遇见尾随航海轮船，摘取被激动到水面的鱼类及其他水生动物。

*Phaethon aethereus* Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 134（模式产地：大西洋：Ascension

Is.）。