

3. 海鸬鹚 *Phalacrocorax pelagicus* Pallas

别名：乌鸬（辞典）。

英文名：Sea Cormorant, Resplendant Shag, Pelagic Cormorant.

地理分布 太平洋北部及西伯利亚东部沿海一带，包括堪察加半岛。在我国见于黑龙江省绥河、兴凯湖（《黑龙江省鸟类志》，1992），辽宁省大连、旅顺，及河北省北戴河为旅鸟；冬时南迁经沿海一带至福建海岸（Caldwell, 1931）及广东（Gee et al. 1926）。据 La Touche (1931—1934)，此鸟当时在我国沿海一带是很常见，可能终年留住，现已锐减。在台湾，据王嘉雄等（1991），仅有几次在台湾捕获过，显然是迷鸟。

形态 前额被羽；头上有二个短羽冠，一在头顶，另一在枕部。全身为黑色，颈部带紫蓝色光泽，其余体羽沾紫蓝色金属反光；头侧裸出部，下胁有一白色块斑；颈和腰等具有一些白色线状细羽。至冬时，羽冠以及所有白色均消失。

量度（据 La Touche）：

| 性别 | 嘴峰 | 翅 | 尾 | 跗蹠 |
|----|-------|---------|---------|-------|
| 。 | 47—52 | 252—273 | 140—161 | 50—60 |

分类讨论 本种有二个亚种；获见于国内的是指名亚种。另一亚种分布于墨西哥西北部的海域中。

生态 为海洋性鸟类，活动于隐蔽的沿岸的海水、海湾及河口，亦在宽阔的大海中。食物以各种海鱼为主。繁殖常结小群，有时单独。巢营于海边峭壁或岩穴间（Hoyo, 1992）。

Phalacrocorax pelagicus Pallas, 1811, Zoogr. Rosso-Asiat. 2: 303 (模式产地：西伯利亚东部堪察加半岛)。