

5. 黑颈鸬鹚 *Phalacrocorax niger* (Vieillot)

别名：小鸬鹚。

英文名：Black-necked Cormorant, Little Cormorant, Javanese Cormorant.

地理分布 自加里曼丹岛、爪哇岛以至印度和孟加拉国及中南半岛。在国内，见于云南省南部盈江、陇川、腾冲、潞西、耿马、蒙自等地。

形态 (据 Baker, 1929) 全身黑而带深蓝或蓝绿色光泽；两肩、内侧次级飞羽及中大覆羽均为暗银灰色，羽缘黑色；头顶前部、头和颈的两侧具有一些白色丝状细羽。在繁殖期中，枕部有一个微小的羽冠。

量度：

性别	喙峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♀	20—34	181—205 (1只212)	133—140	35—40

分类讨论 本种现认为是单型种，并无亚种分化。亚洲中部另有一种，叫侏鸬鹚 *P. pygmeus* (Pallas)，英文名 Pygmy Cormorant。体形大小与本种相似。有人认为二者均隶于同一个种。这样看来，黑颈鸬鹚和侏鸬鹚均当作单一个种的两个亚种。可是侏鸬鹚的背部黑色沾绿，而杂以白色点斑，头部为青铜或栗褐色，显然与黑颈鸬鹚有别；况且它与黑颈鸬鹚在分布上相隔很远，前者在古北界而后者却在东洋界。所以现今一般都把它俩列为不同的二个独立种。

生态 常栖于低地的淡水区，包括湖泊、池塘、江河、沼泽地及稻田等；亦见于沿海地带及河口、红树林间。主要以小型淡水鱼、蛙和蝌蚪等为食。繁殖大都在水淹区域的树木上或灌木丛间。

Hydrocorax niger Vieillot, 1817, Nouv. Dict. Nat. Hist. 8: 88 (模式产地：“East Indies”；实指孟加拉国)。

Carbo javanicus Horsfield, 1821, Trans. Linn. Soc. 13: 197 (模式产地：印度尼西亚爪哇)。