

## 2. 黑脚信天翁 *Diomedea nigripes* Auduson

英文名: Black-footed Albatross.

英文名: Wedge-tailed Shearwater.

**地理分布** 于印度洋和太平洋的热带和亚热带海域。在我国澎湖列岛曾于5月间捕获一只, 现存台北市博物馆; 1981年10月于台湾宜兰获得一只, 存于台中市鸟会, 均为迷鸟。

**形态** 上体暗栗褐色, 背羽和翅上覆羽均狭缘以淡褐色; 头及颈等的两侧灰褐; 下体纯白; 尾稍长, 呈楔状。

嘴灰黑或则淡红而具黑端。

量度 (张万福, 1985):

性别	嘴峰	翅	尾
♂ ♀	38—40	285—302	129—146

本种计有4个亚种。见于我国仅下列一亚种: *Puffinus pacifica cuneatus* Salvin, *Puffinus cuneatus* Salvin, 1888, Ibis (5) 6: 353 (Hawaiian and Bonin Is., Pacific Ocean)。

**生态** 据 Hoyo 等 (1992), 此种海鸟多见于远洋的岛屿, 结群繁殖, 产卵于洞穴中。  
*Procellaria pacifica* Gmelin, 1789, Syat. Nat. 1: 560 (Kermadec Is., Pacific Ocean, *ex Mathews*) .