

## 1. 白腰叉尾海燕 *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot)

别名:白腰海燕(鸟类试编)。

英文名:Fork-tailed Storm Petrel, Leach's Storm Petrel, Fork-tailed Petrel.

**地理分布** 太平洋北部及大西洋自北而南抵巴西及非洲南端。国内仅偶见于黑龙江下游及江口。

**形态** 上体乌黑褐色,额、头顶前部、眼先等沾灰;翅上覆羽灰褐,形成一道较淡的横带。下腰的羽端以及尾上覆羽均白,而具褐色羽干。下体较多褐色带灰,尤以颈、喉等部为然。

**量度**(据 Witherby, 1924, vol. 2, p. 414):

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (12)	15—16.5	150—160	中央一对:59—67 最外侧一对:76—90 尾叉深度:14—25	23—26
♀♀—	—	149—160		

(个别164, 165)

**生态** 远洋性海鸟,罕飞抵陆地上。结群繁殖于岛上高地的岩石间,有时在草根堆中。本种有4个亚种;见于我国北部的,当为指名亚种。

*Procellaria leucorhoa* Vieillot, 1818, *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, nouv. ed., 25(1817), p. 422 (模式产地: Picardy, France).