

4. 曳尾鹱 *Puffinus pacifica* (Gmelin)

别名：楔尾鹱；长尾水薙鸟（台湾）。

英文名：Wedge-tailed Shearwater.

地理分布 于印度洋和太平洋的热带和亚热带海域。在我国澎湖列岛曾于5月间捕获一只，现存台北市博物馆；1981年10月于台湾宜兰获得一只，存于台中市鸟会，均为迷鸟。

形态 上体暗栗褐色，背羽和翅上覆羽均狭缘以淡褐色；头及颈等的两侧灰褐；下体纯白；尾稍长，呈楔状。

嘴灰黑或则淡红而具黑端。

量度（张万福，1985）：

性别	嘴峰	翅	尾
♂ ♀	38—40	285—302	129—146

本种计有4个亚种。见于我国仅下列一亚种：*Puffinus pacifica cuneatus* Salvin, *Puffinus cuneatus* Salvin, 1888, Ibis (5) 6: 353 (Hawaiian and Bonin Is., Pacific Ocean)。

生态 据 Hoyo 等 (1992)，此种海鸟多见于远洋的岛屿，结群繁殖，产卵于洞穴中。*Procellaria pacifica* Gmelin, 1789, Syat. Nat. 1: 560 (Kermadec Is., Pacific Ocean, ex Mathews)。