

20. 大麻鸦 *Botaurus stellaris* (Linnaeus)

别名：大水骆驼、蒲鸡、大麻鹭（台）。

英文名：Great Bittern, Eurasian Bittern.

地理分布 新疆、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁及河北为夏候鸟；辽宁南部、山西、




图35 大麻鸦 *Botaurus stellaris* 的分布

甘肃、河南、山东，长江流域从江苏、浙江到四川，云南、福建、广东、广西及新疆西部为冬候鸟或旅鸟；贵州、台湾为冬候鸟；冬季偶见于河北南部。国外分布于亚洲东部，欧洲及非洲各地。

鉴别特征 体形大，头顶黑色，上体皮黄色带暗色纵纹，下体由黑、褐及皮黄色形成杂斑。

形态 雄性成鸟：额、顶棕黑色，颊部棕黑且向后延伸，颈侧及后颈淡棕黄色并具暗褐色细横斑；上体黄褐色并具黑褐色纵纹；额、喉棕白色，中央具一棕褐色纵条纹；初级飞羽红棕色、具棕黑色横斑；下体棕黄色，上胸具棕褐色粗纵纹，腹部具黑褐色纵条纹。雌雄同色。

虹膜黄色，嘴黄，嘴脊前端黄褐，跗蹠及趾绿黄色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (4)	950—1600	667—745	68—74	334—358	111—126	96—100
♀ (2)	800, 855	644, 672	58, 70	285, 304	97, 120	85, 97

分类讨论 大麻鸦有2个亚种，我国仅有指名亚种。采自辽宁营口的 *orientalis* 亚种实为指名亚种的同物异名。

(1) 指名亚种 *Botaurus stellaris stellaris* (Linnaeus)

形态 详见种的描述。

Ardea stellaris Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 144 (模式产地：瑞典)。

Botaurus stellaris orientalis Бутурлин, 1908, Наша Охота: 9 (模式产地：中国辽宁营口)。

生态 栖息于河流、湖泊、池塘的芦苇丛及沼泽地中。在贵州见于海拔2200m的威宁草海。夜行性，白天藏于沼泽或草丛间。多单只活动。遇人时，嘴向上伸，静立拟枯苇状，不善飞。以鱼、虾、螺、蟹、蛙、泥鳅及水生昆虫为食。在水域附近的芦苇丛或草丛中营巢。窝卵数3—7枚，卵呈橄榄褐色。雌雄共同孵卵，孵化期25—26天。据1987—1991年统计，我国主要的越冬种群在江苏盐城滩涂，计有410只，高邮湖（100只）以及河北团泊洼、江西鄱阳湖等地，总数不及千只 (Perennou *et al.*, 1994)。

经济意义 可供观赏。肉可食，过去为狩猎鸟之一，现种群数量下降，应注意保护。

Ardea stellaris Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 144 (模式产地：瑞典)。