

3. 灰鹱 *Puffinus griseus* (Gmelin)

别名：灰色水薙鸟（台湾）。

英文名：Grey Shearwater, Sooty Shearwater.

地理分布 于太平洋和大西洋的南部。Mathews 和 Iredale (1915) 查看了 Owston 于 1905 年 5 月在澎湖列岛捕获的 2 只标本，认为是新亚种，而在此处繁殖。La Touche 于 1916 年 5 月在福州沿海亦得一只标本。据王嘉雄等 (1991)，在台湾日月潭及垦丁公园均见有陈列标本各 1 只。

形态 上体自头部至尾悉暗褐色，背羽和翅上的覆羽等均具稍淡的羽缘；下体大都灰褐，至喉转为鸽灰色。翅下覆羽大都灰白。

量度 (据 Hartert):

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♀	42—45	293—320	85—97	55—60

生态 据 Hoyo (1992)，此鸟在新西兰，澳大利亚东南部及南美洲的南部繁殖。至冬漂游至北部海域。它在台湾海峡当是迷鸟。

Procellaria grisea Gmelin, 1788, Syst. Nat., ed. 13, 1: 564 (模式产地: New Zealand) .

Neonectris griseus pescadorei Mathews and Iredale, 1915, Ibis (10) 3: 602 (模式产地: 澎湖列岛).