

#### 4. 池鹭 *Ardeola bacchus* (Bonaparte)

别名：红毛鹭、花窖子、红头鹭鹭、沙鹭、沼鹭、田螺鹭。

英文名：Chinese Pond Heron.

**地理分布** 夏季分布于长江以南，西至四川雅安、康定，西藏札达，少量分布北至青海湖、甘肃、陕西南部、河南、河北、内蒙古、吉林中部、辽宁；在广西、云南、贵州、浙江、广东、海南、福建等省区为留鸟；偶见于台湾。国外分布于马来西亚及加里曼丹。

**鉴别特征** 繁殖期头和颈暗栗色，背部石板黑色，胸部酱褐。

**形态** 与瑶山亚种相近，但体形略小。

*Ardea javanica* Horsfield, 1821, Trans. Linn. Soc. London 13: 190 (模式产地：爪哇)。

**生态** 栖息于山间溪流、湖泊、滩涂及红树林中，平原地区较少见。在贵州分布于海拔350—750m，在秦岭可达海拔1300m。常单个或2—3只结小群活动，在溪边或水中岩石边注视水流等食，有时亦活动于稻田。据在云南景东观察，全天均有觅食活动，但以黄昏为主。*amurensis* 和 *actophilus* 是仅有的两个迁徙亚种。4月迁至繁殖地，在近水的阔叶林或灌木林的树冠隐蔽处筑巢，巢呈浅盘状，窝卵数3—5枚，雌雄共同孵卵，孵化期20—22天。9月下旬迁往越冬地。据1987—1991年统计，中国越冬种群主要在江苏沿海，数量亦不足百只 (C. Perennou *et al.*, 1994)。食物主要为鱼、蛙类、螺类及昆虫等。6月剖检一胃 (估计为瑶山亚种)，内含一只泽蛙及少量昆虫碎片 (据诸葛阳, 1990)。

**经济意义** 体羽可用于羽毛画的制作。种群数量的下降应引起重视。

*Ardea striata* Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 144 (模式产地：苏里南)。

*Ardea (Butorides) virescens* var. *amurensis* von Schrenck, 1860, Reis. Forschung. Amur Lande I (2): 441 (模式产地：中国黑龙江)。

♂♂ (2)	200, 255	450, 470	62, 66	178, 192	69, 75	51, 52
♀♀ (5)	200—266	431—470	57—67	185—197	77—82	49—53

**分类讨论** 自1849年 Blyth 确立 *Butorides* 属后，一直沿用百余年。现有人主张将此属并入 *Ardeola* 属，并将 *connectens* 亚种归入 *actophila* 亚种，将产于台湾的绿鹭划归 *carcinophila* 亚种 (Mayr, 1979)。考虑到在栖息地、群集性等生态习性上的明显差异，我们赞同保留 *Butorides* 属。*javanicus* 亚种与 *carcinophila* 亚种在形态上十分接近，而后者本身的性状亦不稳定，故我们仍保留在台湾的繁殖鸟为 *javanicus* 亚种。

**亚种分化** 绿鹭在世界上有30个亚种，我国分布有3个亚种。

#### 亚种检索

- 翅长超过190mm ..... 黑龙江亚种 *B. s. amurensis*
- 翅长在175—199mm 之间 ..... 瑶山亚种 *B. s. actophilus*
- 翅长不及175mm ..... 海南亚种 *B. s. javanicus*

##### (1) 黑龙江亚种 *Butorides striatus amurensis* von Schrenck

东北东部、西南部及河北北部繁殖；经山东、江苏、安徽、浙江、福建、台湾等至更南地区越冬 (部分留在台湾越冬)。

**形态** 与瑶山亚种相近，但体形略大。

*Ardea (Butorides) virescens* var. *amurensis* von Schrenck, 1860, Reis. Forschung. Amur Lande I (2): 441 (模式产地：中国黑龙江省)。

##### (2) 瑶山亚种 *Butorides striatus actophilus* Oberholser

甘肃康县、陕西南部为夏候鸟；四川、云南、贵州、广西及长江以南各省为夏候鸟或留鸟。

**形态** 见种的描述。

**量衡度：**

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (2)	180, 190	434, 456	59, 60	176, 184	62, 70	50, 51
♀♀ (3)	200—266	431—450	57—64	185—197	77—82	49—53

*Butorides javanicus actophilus* Oberholser, 1912, Smithsonian Misc. Coll. 60 (7): 1 (模式产地：印度尼西亚)。

*Butorides striatus connectens* Stresemann, 1930, Orn. Monatsb. 38:48 (模式产地：中国广西瑶山)。

##### (3) 海南亚种 *Butorides striatus javanicus* (Horsfield)

广东珠江口、台湾、海南为留鸟。