

17. 紫背苇荭 *Ixobrychus eurhythmus* (Swinhoe)

别名：水骆驼、秋荭、秋小鹭（台湾）。

英文名：Schrenck's Bittern.

地理分布 东北、河北、河南、山东、安徽、浙江、长江流域、四川、福建、广东、广西、西藏察隅为夏候鸟；云南、台湾为旅鸟；海南为冬候鸟。国外分布于亚洲东部，马来西亚，巽他群岛及菲律宾群岛。

鉴别特征 头顶黑色，上体暗栗色，下体棕白。

形态

雄性成鸟：头顶黑，脸栗色，颈侧有一白斑；上体暗棕栗色；下体喉白色、余部棕黄、中央有一黑褐色纵纹。




图32 紫背苇荭 *Ixobrychus eurhythmus* 的分布

雌性成鸟：头顶黑；上体黑、栗、白杂斑状；下体棕黄色杂以栗黑色纵纹，腹部及尾下覆羽白色；翼上覆羽棕栗色杂以白点斑。

虹膜黄褐色，上嘴黑褐，下嘴角白，跗蹠绿褐色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (1)	86	385	51	150	46	51
♀♀ (2)	70, 85	300, 318	43, 46	135, 137	45, 46	40, 46

分类讨论 至今未见有亚种分化。

生态 栖息于水库和山脚边的稻田、芦苇丛、滩涂及沼泽草地，常单独或结3—5只小群活动于稻田及河川附近。在西藏见于海拔2300m的农田。捕食鱼虾及水生昆虫。在草丛或苇丛中营巢。巢很简陋，每窝卵5枚左右，卵呈白色、无斑。据1987—1991年统计，国内仅在东部有1次本种越冬种群 (Perennou et al., 1994)。

经济意义 可供观赏；捕食农业害虫；但数量多时，对养鱼业有害处。

Ardea eurhythmia Swinhoe, 1873, Ibis (3) 3: 74 (模式产地：中国厦门，上海)。