

2. 草鹭 *Ardea purpurea* Linnaeus

别名：紫鹭（台湾）、花骛马、长脖老等。

英文名：Purple Heron.

地理分布 遍布我国东部及东南部。黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、陕西石泉、华北、长江中下游为夏候鸟或旅鸟；宁夏泾源为旅鸟；云南路西、耿马为留鸟；四川、福建、广东、台湾为旅鸟或冬候鸟。国外分布于印度，伊朗，欧洲南部，非洲及马达加斯加岛等地。




图22 草鹭 *Ardea purpurea* 的分布

鉴别特征 体型较苍鹭更瘦，颈细长，颈侧栗褐色而具黑色条纹，下体黑色。

形态

雄性成鸟：头顶黑，有羽冠及延长的羽冠带；颊、喉白色，嘴裂处有蓝黑色条纹向后经颊会合于枕部后延伸至后颈基部；颊部亦有蓝黑色条纹经颈侧延伸至前胸；前颈栗红，后颈银灰；上胸有白色杂黑灰的蓑羽，下胸两侧深栗红，两肋灰色，腹中部黑色；肩羽栗紫色，背、腰暗灰；初级飞羽黑色，次级和三级飞羽灰色，三级覆羽延伸细长、呈棕黄色，翼下覆羽棕黄色；中爪内侧具栉缘。雌雄同色。

幼鸟：头顶黑褐色，上体深灰色，羽缘沾棕，前颈棕色，有黑褐色纵纹延至前胸，肋灰，腹棕白，飞羽及尾羽深灰，三级飞羽端部沾棕。

虹膜、眼先裸部及嘴角均为黄色，上嘴先端角褐色，跗蹠前缘栗褐色，后缘角黄色，趾赤褐色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (3)	900—1900	920—1016	—	—	—	—
♀♀ (2)	1000 (1)	930 (1)	119, 120	373, 385	133, 145	125, 128

亚种分化 草鹭有两个亚种，在中国分布的只一亚种。

(1) 普通亚种 *Ardea purpurea manilensis* Meyen

形态详见种的描述。

Ardea purpurea var. *manilensis* Meyen, 1834, Nova Acta Acad Caes. Leopoldino-Carolinae Nat. Curios. 16, Suppl. 1: 102 (模式产地：菲律宾马尼拉)。

Phoebastria purpurea ussuriensis 28: 399 (模式产地：中国黑龙江)。

生态 栖息于沼泽、湖泊、稻田等地。常结3—5只小群活动于水边，以鱼、虾、青蛙及昆虫为食。3—4月飞抵繁殖地，集群营巢在松、榆树上或芦苇、杂草丛中。每窝卵3—6枚，4枚卵大小为52.4(51.2—54.9)mm×38.8(38—39)mm，重37.3(33—39)g(据赵正阶等，1985)。雌雄共同孵卵，孵化期24—28天，幼鹭约42天离巢。1992年春，从北京东郊金盏乡获一只迁徙落伍的幼鸟。喂养时嗜食有鳞的小鱼。据1987—1991年统计，中国越冬种群主要有两处：江苏盐城滩涂和河北的团泊洼，数量在百只左右(Perennou *et al.*, 1994)。1985年6月29日在黑龙江省扎龙保护区环志的一只草鹭，于同年10月14日在广东省台山县被回收。50年代初期见于台湾屏东潮州的草鹭营巢处现已消失(据陈炳煌、颜重威，1977)。

经济意义 冠羽、肩羽、胸羽、初级飞羽等可作饰羽，销往国外。成鸟可供观赏。

Ardea purpurea Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1: 236 (模式产地：“in Oriente”，后改为法国，据Stresemann, 1920, Avifauna Macedonica, p. 226)。