

8. 黄嘴白鹭 *Egretta eulophotes* (Swinhoe)

别名:唐白鹭(台)、白老等。

英文名:Chinese Egret, Swinhoe's Egret.

地理分布 广东、海南、福建为夏候鸟;西沙群岛为冬候鸟;偶见于辽宁、吉林、山东、江苏、浙江及台湾。国外分布于朝鲜半岛,印度尼西亚苏拉威西岛,菲律宾,马来西亚及越南。

鉴别特征 繁殖期嘴黄,体羽白,羽冠向后呈丛状,脚黑而趾绿黄,冬季脚变黄绿色。

形态 雄性成鸟 繁殖羽:通体白色,头胸沾沙黄,枕羽延伸成较长的羽丛,背及前颈有饰羽。冬羽:背及前颈无饰羽。雌雄同色。

虹膜黄白色、眼先裸部蓝色(冬季黄绿色),嘴橙黄色(冬季黄褐色,下嘴基部黄色),脚




图28 黄嘴白鹭 *Egretta eulophotes* 的分布

黑(冬季黄绿色),趾绿黄色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (2)	320,395	455,520	54,62	250,258	86,98	90,91
♀♀ (2)	295,415	475,560	56,77	236,255	87,92	76,87

分类讨论 此种至今未见亚种分化。但往往因羽色及嘴色的变化而将冬季的牛背鹭或白鹭误认为是黄嘴白鹭。

生态 栖息于海滨或港湾的沙州、水田。以鱼、虾、甲壳类及昆虫为食。常栖于树上或岩礁上,在浅水处涉水觅食。在台湾曾有黄嘴白鹭与白鹭、牛背鹭、苍鹭、夜鹭等混群营巢繁殖的记载(Swinhoe, 1863),但现在已无此现象(颜重威, 1989)。据1987—1991年统计,我国在江苏盐城滩涂见有60只的越冬种群(Perrenou *et al.*, 1994)。

经济意义 因种群数量下降,被列为国家二级重点保护动物。1990年被世界自然及自然资源保护联盟(IUCN)红皮书列为濒危物种。

Herodias eulophotes Swinhoe, 1860, Ibis 2: 64(模式产地:中国厦门)。