

14. 黑冠 [夜] 鸬 *Gorsachius melanolophus* (Raffles)

别名：黑冠虎斑鳽、黑冠麻鹭（台）。

英文名：Tiger Bittern, Malayan Night-Heron.

地理分布 云南南部、广西为夏候鸟；台湾、海南为留鸟。国外分布于印度南部，苏门答腊，爪哇，菲律宾群岛，尼科巴群岛。

鉴别特征 头顶及羽冠黑色，嘴短而厚，背及翼上覆羽暗栗色，初级飞羽羽端白色。

形态

雄性成鸟：头顶及羽冠黑色，脸部栗褐色，后颈深栗色；上体暗棕栗色带黑色蠹状纹；下体喉白、中部杂以黑色点斑，胸部棕黄色杂以黑斑，腹侧、两胁及腋羽均为棕白色具黑色粗横斑；飞羽黑色、先端具栗斑杂以黑纹，初级飞羽最先端具白斑；尾羽烟黑色，尾下覆羽白色杂以黑纹。

雌雄同色。

幼鸟：头顶黑色、羽端细白斑，羽冠黑色具白点斑，上体黑褐色带棕黄色蠹状横纹；下体棕黄色杂以黑白条纹；初级飞羽黑色、羽端白、杂以黑点斑，初级覆羽栗黄色、羽端白、杂以黑斑；尾羽黑色；上嘴黑，下嘴角黄，跗蹠黑褐色。

眼先裸部蓝色（冬季黄绿色），嘴黑，跗蹠暗褐色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (2)	—	351, 500	47	265, 275	110, 111	67, 69
♀ (1)	410	—	48	251	88	69

分类讨论 Perennou *et al.* (1994) 认为本种有4个亚种，除指名亚种外，3个亚种都是留鸟。中国只有指名亚种。

生态 栖息于低海拔的沼泽密林、芦苇丛或竹林中。常单独活动于稻田或池塘边，以鱼、虾及水生昆虫为食。在树上营巢，窝卵数3—5枚。据1987—1991年统计，只在东南亚有少量越冬种群的报道 (Perennou *et al.*, 1994)。

经济意义 由于其栖息环境的变化，此种也已临近绝迹，极需加以保护。

Ardea melanolophus Raffles, 1822, Trans. Linn. Soc. London 13 (2): 326 (模式产地：苏门答腊)。

Gorsachius melanolophus minor Hachisuka, 1926, Ibis, p. 592.