

### 3. 彩鹮 *Plegadis falcinellus* (Linnaeus)

英文名: Glossy Ibis.

**地理分布** 国内偶见于上海与宁波间的湖沼、福州, 以及广东沿海岛屿。国外分布欧洲南部, 亚洲, 非洲, 美洲中部。

**鉴别特征** 体长约600mm。头部除面部裸出外皆被羽。体羽大部为青铜栗色。嘴长而下弯, 呈黑色。跗蹠前缘具盾鳞。

**形态** (据 Baker, 1929) 成鸟: 体羽大都红褐色; 头顶、头侧、颈、前喉等均具紫绿色光泽; 脸部裸露, 裸皮及眼圈铅色; 颈、上背、肩和最内侧翼上覆羽色深, 富有栗色; 下背、腰、尾上覆羽具紫绿色光泽; 飞羽黑色; 尾羽黑色, 基部具缘色光泽, 其余部分具紫色光泽; 中覆羽具紫色光泽, 翅的余部具绿色光泽。腋羽和尾下覆羽深紫色, 体下余部羽毛栗色。

虹膜灰、褐或斑灰和褐色; 嘴深铅色或铅褐色; 跗蹠与趾黄褐色, 膝部青铜色。

**量衡度:**

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♀	600	560	91—144	248—298	94—106	85—110

**分类讨论** 本种现有2个亚种, 即指名亚种 (*Plegadis f. falcinellus*) 和 *P. f. peregrinus*。前者分布于欧、亚及非洲等, 而后者则产于菲律宾以至澳大利亚。见于我国境内的为指名亚种。

**生态** (据 Baker, 1929) 通常结群, 栖息在湖沼间, 不在多雨或干旱的地区活动。

**经济意义** 彩鹮在我国极稀少, 难得一见, 已列为国家保护鸟类。形态较奇特, 可供观赏。

*Tantalus Falcinellus* Linnaeus, 1766, Syst, Nat., ed. 12, 1: 241 (模式产地: 奥地利和意大利)。