

5. 白琵鹭 *Platalea leucorodia* (Linnaeus)

别名：篦鹭、等盘子。

英文名：Spoonbill.

地理分布 国外分布欧洲南部，非洲，亚洲等。国内分布于黑龙江省三江平原、松嫩平原（繁殖鸟），东北吉林、辽宁等省，内蒙古呼伦贝尔盟、乌梁素海，新疆准噶尔盆地，四川昌都（旅鸟）；河南、山东、长江下游、福建、江西、广东（旅鸟、冬候鸟）；台湾、澎湖列岛（冬时罕见）。

鉴别特征 体型似大白鹭，而较小些。嘴直而平扁，前端扩大成匙状。冬羽全身白色，夏羽颈部具黄色，头具羽冠。眼周和喉裸出。

形态（据上海自然博物馆采自安庆的标本）

成鸟：雌雄羽色相同。冬羽全身几为白色。上体额至尾白色。眼先、眼周裸出部黄色。头、颈全白，翅几全白。第1、2枚初级飞羽的外侧淡褐色，内侧羽片的远端淡褐色；第3、4枚初级飞羽外翈具白色宽缘，余部淡褐色。颈和上喉裸出，呈黄色。下喉、胸、腹、肛周和尾下覆羽白色。

夏羽除头部具明显的白色羽冠，颈部具黄色圈外，其它与冬羽同。

幼鸟：与成鸟的冬羽同。

虹膜红色。嘴黑色，先端黄色，上嘴有黑色纵纹，纹间为黄褐色。跗蹠、趾和爪等均为黑色。

量度：

性别	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (2)	775, 805	205, 223	387, 395	127, 134	141, 142
♀ (2)	774, 776	182, 199	363, 385	121, 122	131

亚种分化 白琵鹭共有4个亚种。我国只有一个亚种，即指名亚种 *Platalea l. leucorodia* Linnaeus.

Platalea Leucorodia Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 139 (模式产地：瑞典).

分布、形态和量衡度见前述。

生态 平时栖息在苇丛、近浅水具有低树的沼泽间。冬季集群活动在开阔的沼泽，咸水湖，与海通连的江、河口，沿海的浅水区以及河、湖浅水间。常集成几十至百余只的大群，在浅水间用琵形的长嘴从一侧划向另一侧，边划边缓慢前进，以这种方式寻找食物，觅食的姿态甚为特殊。1983年12月上旬，作者在江西鄱阳湖畔的吴城镇中湖池中，见到近300只的大群白琵鹭聚集在浅水间觅食，边觅食边发出鸣叫。远远看去还认为是一群天鹅。食物主要是小鱼、水生昆虫、蝌蚪、蠕虫、蜗牛及昆虫幼虫。除繁殖期间发出似小猪“哼哼”的声音和兴奋时用长嘴敲击的嗒嗒声外，平时几乎寂静无声。一年繁殖一次。据《中国经济动物志·鸟类》记述，繁殖期自3月末起，直至7月。巢筑在草丛间地上或灌木和乔木的枝叉间，形状宽大而平扁，由细枝条、叶和其他植物物质构成。产3—4枚卵。卵白色，具红褐色斑，尤其是在卵的钝端。雌雄同孵经21—25日出壳。雌雄共同抚育雏鸟。4星期后雏鸟能离巢活动，但全身羽毛长成则需45—50天。

经济意义 白琵鹭形态奇特，动物园多有饲养作观赏鸟。由于环境污染等种种原因，自然界中数量日益下降。我国已列为保护鸟。

Platalea Leucorodia Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 139 (模式产地：瑞典).

Platalea major Temminck et Schlegel, 1849, in Siebold, Faun. Jap. Aves: 119, pl. 75 (模式产地：日本).